

成  
方  
切  
用

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷七上

消暑門

正方二十四  
附方二十四

消暑丸

黃連消暑丸

小半夏茯苓湯

方見燥溼門

四味香薷

飲

黃連香薷飲

二香散

三物香薷飲

五縮

脾飲

大順散

來復丹

方見祛寒門

枇杷葉散

冷

香飲子

桂苓甘露飲

又桂苓甘露飲

清暑益氣湯

黃耆人參

湯

補

清燥湯

二妙散

六一散

散

雞蘇散

溫六丸

三生益元散

黃耆六一散

吳

五苓散

方見

竹葉

成方切用

暑

卷七上

目錄

十

石膏湯

方見火門

人參白虎湯

方見火門

生脈散

五味子湯

氣湯

補氣丸

茯苓湯

水葫蘆丸

大黃龍丸

潑火散

總論消暑諸方

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較  
有杜雋望

成方切用

消暑門

暑本夏月之熱病。左傳陰暘人於樾。暑烈日之時。或於長途。或於田野。不辭勞苦。致病頭疼煩躁肌體大熱大渴等證。遇無汗者。必以得汗為正治。宜先散外邪。得汗已。方清其內。若多汗者。宜察氣之虛實。火之微甚。或清或補可也。有畏暑貪涼。不避寒氣。或於

深堂大厦。或於風地樹陰。或乍熱乍寒之時。

不謹衣被。以致寒邪襲於肌表。而病發熱惡寒。頭痛無汗。身形拘急。肢體痠疼等證。惟少溫散為主。當以傷寒法治之。又有不慎口腹。過食生冷。以致寒涼傷臟。而為嘔吐瀉痢腹痛等證。治宜溫中為主。苟其不分表裏。不察陰陽。則殺人慘於刀刃矣。

消暑丸治伏暑煩渴發熱頭痛脾胃不利

半夏一觔醋五 茯苓 甘草半觔 薑汁糊丸

勿見生水熱湯下有痰生薑湯下

長夏炎蒸溼土司令故暑必兼溼證見便秘煩渴或吐或利者以溼勝不得施化也此方不治其暑顯治其溼用半夏茯苓行水之藥少佐甘

草以和其中半夏用醋煮者醋能開胃散水斂  
熱解毒也使暑氣溼氣俱從小便下降則脾胃  
和而煩渴自止矣熱蒸其溼是為暑無溼則但  
溼多即病暑者多瘦  
人火多即病熱者多

本方一兩黃連二錢名黃連消暑丸治伏暑煩渴

而多熱痰

小半夏茯苓湯

金匱

治卒嘔吐心下痞膈間有水

眩悸

方見下卷燥溼門

四味香薷飲 治感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重

或煩渴或吐瀉

香薷一兩厚朴薑汁炒

藟豆錢炒五

黃連薑炒

三錢

冷服

香薷辛熱必冷服者經所謂治溫以清涼而行之也熱服作瀉

香薷辛溫香散能入脾肺氣分發越陽氣以散

皮膚之蒸熱厚朴苦溫除溼散滿以解心腹之

凝結藟豆甘淡能消脾胃之暑溼降濁而升清

黃連苦寒能入心脾清熱而除煩也

李時珍曰有處高堂

大廈而中暑者緣納涼太過飲冷太多陽氣爲陰邪所遏反中入內故見頭痛惡寒之證用香

蕭以發越陽氣散水和脾則愈王履曰此非中  
暑蓋亦傷寒之類爾按香薷乃夏月發汗之藥  
其性溫熱只宜於受寒之人若暑火證服之反  
成大海凡元氣虛者用之適足以招暑今人謂  
能解暑藥用代茶是開門揖盜也

除藕豆名黃連香薷飲治中暑熱盛口渴心煩

或下鮮血

暑邪所逼

加茯神治痺瘧

獨熱不寒日痺瘧當責之暑邪

暑先入心故加茯神以寧心

除黃連加木瓜甘草香附陳皮

蒼朮紫蘇名二香散

蓋合香薷飲香蘇飲爲一方也

治外感內

傷身熱腹脹除黃連名三物香薷飲治傷暑嘔

逆泄瀉再加茯苓甘草名五物香薷飲驅暑和



中再加木瓜名六味香薷飲治中暑溼盛再加

人參黃耆白朮陳皮名十味香薷飲治暑溼內

傷頭重吐利身倦神昏用陽旦湯得之便厥傷

暑夾陰誤用香薷飲入喉便痞後賢於香薷飲中加人參黃耆白朮陳皮木瓜兼治內傷誠有

見也三物香薷飲加羌活防風治夏月僵仆手足

搐搦名暑風或再加黃耆芍藥

縮脾飲 清暑氣除煩渴止吐瀉霍亂及暑月酒

食所傷

藊豆研乾葛二砂仁 草薺去烏梅 甘草

炙四

每服四錢

暑必兼溼而溼屬脾土暑溼合邪脾胃病矣故  
治暑必先去溼砂仁草薹辛香溫散利氣快脾  
消酒食而散溼菟豆專解中宮之暑而滲溼溼盛則津不生而渴葛根能升胃中清陽而生津風藥多燥唯葛根能生津烏梅清熱解渴甘草補土和中

大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受溼水穀

不分清濁相干陰陽氣逆霍亂吐瀉臟腑不調

乾薑 桂 杏仁去皮 甘草 等分先將甘草

用白砂炒次入薑杏炒過篩去砂淨合桂爲末  
每服二三錢湯點服

夏月過於飲冷飡寒陽氣不得伸越故氣逆而  
霍亂吐瀉也脾胃喜燥而惡溼喜溫而惡寒乾  
薑肉桂散寒燥溼杏仁甘草利氣調脾皆辛甘  
發散之藥升伏陽於陰中亦從治之法也吳鶴皋曰  
此方非治暑乃治暑月飲冷受傷之脾胃弱。  
大蔞辛熱通竅故亦有宜用者若係火熱諸證  
而投此等辛熱之  
品禍不旋踵矣。

來復丹

治伏暑泄瀉身熱脈弱

方見卷六下祛寒門補火丸附方內

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭

目昏眩

枇杷葉

去毛炙

陳皮

去白焙

丁香

厚朴

去皮薑汁炙五錢

白茅根

麥門冬

乾木瓜

甘草

香薷錢半

搗羅爲末每服二錢水一盞生薑三片煎七

分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花水調下

小兒三歲以下可服五分更量大小加減

冷香飲子

治傷暑口渴霍亂腹痛煩躁脈沉微

或伏

附子

炮

陳皮

錢一

甘草

錢半

草薢

錢半

水盞

半

薑

十

片煎八分去渣并水頓冷服

桂苓甘露飲

河間

治中暑受溼引飲過多頭痛煩

渴溼熱便祕

滑石

兩四

石膏

寒

水石

錢五

甘草

兩二

白朮

錢五

茯苓

錢五

澤瀉

兩一

豬苓

肉桂

錢五

每服

三錢

或五錢

錢五

錢五

錢五

錢五

錢五

此五苓六一之合劑以清六腑之熱也

張子和去豬苓減三石一半加人參乾葛

各一兩

各一兩

藿香木香

各一錢

減桂只用一錢每服三錢亦名

桂苓甘露飲治伏暑煩渴脈虛水逆

渴欲飲水水入即吐

名水逆

清暑益氣湯

東垣

治長夏溼熱炎蒸四肢困倦精

神減少胸滿氣促身熱心煩口渴惡食自汗身

重肢體疼痛小便赤澀大便溏黃而脈虛者

暑

蒸人脾土受傷故肢倦便溏暑熱傷肺故氣促心煩口渴便赤濁氣在上則生膈脹故胸滿惡食暑先入心汗為心液故自汗溼盛故身痛身重寒傷形表邪外盛故脈大而有餘暑傷氣元氣耗傷故脈虛而不足

黃耆 人參 白朮炒 蒼朮 神麴炒 青皮炒

陳皮白 甘草炙 麥冬 五味 當歸洗酒 黃檗炒酒

澤瀉 升麻 葛根 薑棗煎

熱傷氣參耆益氣而固表溼傷脾二朮燥溼而

強脾火盛則金病而水衰故用麥冬五味以保

肺而生津肺為水之上源火旺克金則金不能生水麥冬合人參生脈生津 用

黃檗以瀉熱而滋水青皮平肝而破滯當歸養

血而和陰神麴化食而消積升葛解肌熱而升

清清氣上升能生津液又風能勝溼 澤瀉瀉溼熱而降濁陳皮

理氣甘草和中合之以益氣強脾除溼清熱也

東垣曰脾虛肺氣先絕故用黃耆閉腠理止汗益氣脾胃既虛陰火傷其生發之氣營衛大虧血虛以人參補之陽旺自能生陰血也。更加當歸和血。又加黃檗以救腎水。蓋甘寒瀉火。火滅則心氣得平而安也。心火乘脾故用炙草瀉火而補脾。少用恐滋滿也。中滿者去之。若腹中急痛急縮者卻宜多用。咳者去人參為清濁相干故以橘皮理之。長夏溼勝故加二木澤瀉上下分消其溼熱也。溼勝則食不化炒麴辛其青皮辛溫消食快氣。五味麥冬人參甘微酸寒瀉火熱而益肺金。救庚金也。醫貫曰有傷暑吐衄者暑傷心。心虛不能生血。不宜過用寒涼以傷心。宜清暑益氣加丹皮生地犀角之類。蓋暑傷心亦傷氣其脈必虛以參耆補氣斯無弊也。

除青皮澤瀉乾葛名黃耆人參湯東垣治暑傷元



氣注夏倦怠胸滿自汗時作頭痛時痛時止除

白朮青皮麥冬五味加茯苓豬苓柴胡羌活防

風連翹知母名補肝湯東垣治陰汗如水陰冷如

冰腳痿無力

清燥湯

東垣

治肺金受溼熱之邪痿躄喘促胸滿

少食色白毛敗頭眩體重身痛肢倦口渴便秘

經曰肺者相傳之官治節出焉火盛尅金則肺熱葉焦氣無所主而失其治節故肢體或縱或縮而成痿躄也火上逆肺故喘促肺主皮毛故色白毛敗溼熱填於膈中故胸滿壅於陽明則食少上升於頭則眩注於身則體重流於關節則身痛肺受火傷天氣不能下降膀胱絕其化

源故曰  
渴便赤

黃耆

錢半

蒼朮

錢炒

白朮

炒

陳皮

澤瀉

五

人參

茯苓

升麻

三

當歸

酒洗

生地黃

麥冬

甘

草

炙

神麴

炒

黃檗

酒炒

豬苓

分

黃連

分

五味子

九

粒

柴胡

三

分

肺屬辛金而主氣大腸屬庚金而主津燥金受  
溼熱之邪則寒水勝生化之源絕源絕則腎水  
虧金不能生水而痿躄諸證作矣金者水之母也氣  
者水之源也黃耆益元氣而實皮毛故以為君

二朮參苓甘橘神麴健脾燥溼理氣化痰所以運動其土土者金之母也麥冬五味保肺以生

津當歸生地滋陰而養血黃檗黃連燥溼而清

熱黃檗合蒼朮為二妙散治熱痿正藥加牛膝名三妙散升麻柴胡所以升

清豬苓澤瀉所以降濁使溼熱從小便出則燥

金肅清肺為高水出高原而諸證平矣朱丹溪曰今世

風病大率與諸痿證混同論治古聖論風痿條目不同治法亦異夫風病外感善行數變其病多實發表行滯有何不可詔接起於肺熱傳入五臟散為諸證其昏惑癱瘓督悶暴病鬱冒蒙昧暴瘡皆屬於火其四肢不舉足痿舌強痰涎有聲皆屬於土悉是溼熱之病當作諸痿論治

大抵祇宜補養。若以外感風邪治之。寧免實實虛虛之禍乎。或曰。內經治痿。獨取陽明。何也。曰。只諸痿生於肺熱一語。已見大意。金體燥而居上。主氣畏火者也。土性溼而居中。主四肢。畏木者也。嗜慾不節。則水失所養。火寡於畏。而侮所勝。肺得火邪而熱矣。肺受熱邪。則金失所養。木寡於畏。而侮所不勝。脾得木邪而傷矣。肺熱則不能管攝一身。脾傷則四肢不為人用。而諸痿之病作矣。瀉南方。則肺金清。而東方不實。何脾傷之有。補北方。則心火降。而肺金不虛。何肺熱之有。故陽明實。則宗筋潤。能束骨而利機關矣。治痿大法。無過於此。

六一散

河間

治傷寒中暑。表裏俱熱。煩躁口渴。小便

便不通。瀉痢熱瘧。霍亂吐瀉。下乳滑胎。解酒熱

毒。偏主石淋。

暑熱皆陽邪。在表則發熱。在裏則瀉痢。霍亂在上則煩渴。在下則便

秘。或熱瀉。火氣煎灼。精結成石。則為石淋。

滑石

六兩

甘草

兩

為末。冷水或燈心湯調下。丹

日泄瀉及嘔吐。生薑湯下。

中寒者加硫黃少許。

滑石重能清降。寒能瀉熱。滑能通竅。然能行水。

使肺氣降而下通膀胱。

火退則肺氣下降。

故能祛暑住

瀉止煩渴而利小便也。

小便利則大便實而瀉自止。

加甘草

者和其中氣。又以緩滑石之滑降也。其數六一

者。取天一生水。地六成之之義也。

故又名天水。散蠶河間曰。

統治上下表裏諸病。蓋取其能通除上下三焦。淫熱也。然在體盛淫多之人。宜服之以解暑利。

水使淫熱從小便出。若無淫之人而服此。則反耗其津液。而渴轉甚矣。又當用生脈散。清淫無淫之人。及肥人內夾虛寒。誤用六一散。解暑驅淫。反促其臟腑氣絕者。比比。

加辰砂少許名益元散鎮心神而瀉丙丁之邪

熱也。小腸為丙火。心為丁火。加薄荷少許。清肺。名雞蘇散加

青黛少許。清肝。名碧玉散加紅麴五錢名清六丸

治赤痢。赤屬血分受傷。紅麴能調六腑之血。加乾薑五錢名溫六

丸治白痢。白屬氣分受傷。乾薑能散淫熱之氣。加生柏葉生車前

生藕節名三生益元散治血淋加牛黃治虛煩

不得眠除甘草加吳茱萸一兩名吳萸六一散

治溼熱吞酸除滑石加黃耆六兩大棗煎熱服

名黃耆六一散治諸虛不足盜汗消渴凡渴證防發癰

道宜黃耆六一散吞忍冬丸

五苓散 治暑溼為病發熱頭疼煩躁而渴

方見下卷燥溼門

竹葉石膏湯 治傷暑發渴脈虛

人參白虎湯 治太陽中暈身熱汗出足冷惡寒

脈微而渴

以上二方俱見卷八下清火門

生脈散

金

治熱傷元氣氣短倦怠口渴多汗肺

虛而咳

肺主氣火熱傷肺故氣短金為火制不

虛故汗出虛火乘肺故欬李東垣曰津者庚火

腸所主三伏之時為庚金受囚若人津液汗大

泄淫熱亢甚燥金受囚風木無制故風淫相搏

骨節煩疼一身盡痛也凡淫熱大行金為火

制絕寒水生之之源致肢體

痿軟胸歎眼黑最宜服之

人參 麥冬 五味子

粒七

肺主氣肺氣旺則四臟之氣皆旺虛故脈絕氣

短也人參甘溫大補肺氣而瀉熱為君麥冬甘

寒補水源而清燥金為臣五味酸溫斂肺生津



收耗散之氣爲佐。蓋心主脈而百脈皆朝於肺。補肺清心則氣充而脈復。故曰生脈。夏月火旺克金。當以保肺爲主。清晨服此能益氣而禦暑也。李東垣曰。手陽明大腸。手太陽小腸。皆屬足陽。陽明胃大腸主津。小腸主液。大腸小腸受胃之陽氣。乃能行津液於上。焦灌漑皮毛。充實腠理。若飲食不節。胃氣不充。大腸小腸無所稟氣。故津液涸竭焉。又曰。夏月加黃耆甘草服之。令人氣力湧出。

加陳皮炙甘草名五味子湯。蒸餅爲丸。名補氣丸。治肺虛少氣咳嗽自汗。加黃耆爲君。甘草桔梗爲佐。名補氣湯。治氣虛自汗怔忡。再加茯神

遠志木通名扶神湯治脈虛欬則心痛喉中介

水葫蘆丸

治冒暑毒解煩渴

川百藥煎

三人參

錢二

麥門冬

烏梅肉

白梅

肉

乾葛

甘草

兩半

爲細末麪糊丸如雞頭

實大含化一丸夏月出行可度一日

按諸葛孔明五月渡瀘溪人不毛分給此丸於

軍士故名水葫蘆曹孟德遙指前有梅林失於

未備爾

大黃龍丸

治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴

嘔吐昏悶不食

舶上硫黃

硝石

兩一

白礬

雄黃

滑石

錢五白

麴

兩四

五味研末入麴和勻滴水丸如梧子大

每服三十丸新汲井水下

潑火散

卽地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死者并

治傷暑煩躁口苦舌乾頭痛惡心不思飲食及

血痢

地榆

赤芍藥

黃連

青皮

去白等分

每服三

錢漿水調服若血痢水煎服

喻嘉言總論消暑諸方曰元豐朝立和劑局萃  
集醫家經驗之方於中暑一門獨詳以夏月暑  
證五方歷試見聞廣爾其取用小半夏茯苓湯  
不治其暑頗治其溼又以半夏茯苓少加甘草  
名消暑丸見消暑在消其溼名正言順矣其香  
薷飲用香薷藟豆厚朴爲主方熱盛則去藟豆  
加黃連爲君治其心火溼盛則去黃連加茯苓  
甘草治其脾溼其縮脾飲則以脾爲溼所浸溼

而重滯於菹豆葛根甘草中佐以烏梅砂仁草  
菓以快脾而去脾所惡之溼甚則用大順散來  
復丹以治暑證之多瀉利者又卽縮脾之意而  
推之也其枇杷葉散則以胃爲溼所竊據而濁  
穢故用香薷枇杷葉丁香白茅根之辛香以安  
胃而去胃所惡之臭甚則用冷香引子以治暑  
證之多嘔吐者又卽枇杷葉散而推之也醫者  
於熱溼虛寒淺深緩急間酌而用之其利溥矣  
而後來諸賢以益虛繼之河間之桂苓甘露飲

五苓三石意在生津液以益胃之虛子和之桂  
苓甘露飲用人參葛根甘草藿香木香益虛之  
中又兼去滯或用十味香薷飲於局方五味中  
增人參黃耆白朮陳皮木瓜益虛以去溼熱乃  
至東垣之清暑益氣湯人參黃耆湯又補中實  
衛以去其溼熱肥白內虛之人所宜服者也中  
暑必兼躁煩熱悶東垣倣仲景竹葉石膏湯之  
制方名清燥湯仍以去溼爲首務夫燥與溼相  
反者也而清燥亦務除溼非東垣具過人之識

不及此矣。又如益元散之去溼而加辰砂則并去其熱。五苓散之去溼而加人參則益虛。加辰砂減桂則去熱。白虎湯加人參則益虛。加蒼朮則勝溼。合之局方則大備矣。然尙有未備焉。嘗觀暑風一證其卒倒類乎中風而不可從風門索治。百一選方雖有大黃龍丸初不爲暑風立法。管見從而贊之曰。有中暈昏死灌之立甦。則其方亦可得暑風之一班矣。儻其人陰血素虧暑毒深入血分進以此丸寧不立至危殆乎。良

方復有地榆散治中暑昏迷不醒人事而欲死者。但用平常涼血之藥清解淡入血分之暑風。良莫良於此矣。後有用之屢效而美其名爲潑火散者。知言哉。夫中天火運流金燥石而此能潑之。益見暑風爲心火暴甚煎熬陰血。含清心涼血之外。無可撲滅爾。綜羣方而論之。因其詳。故益加詳焉。



吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷七下

燥溼門

附方二十七

五苓散

茵陳五苓散

辰砂五苓散

元戎五苓散

蒼朮五苓散

豬苓散

桂苓丸

澤瀉湯

茯苓白朮湯

白茯苓湯

白茯苓湯

白茯苓湯

白茯苓湯

白茯苓湯

白茯苓湯

春澤湯

又春澤湯

二朮四苓湯

二朮四苓湯

二朮四苓湯

二朮四苓湯

二朮四苓湯

二朮四苓湯

二朮四苓湯

散

茯苓琥珀湯

胃苓湯

胃苓湯

胃苓湯

胃苓湯

胃苓湯

胃苓湯

胃苓湯

湯

藿香湯

柴苓湯

柴苓湯

柴苓湯

柴苓湯

柴苓湯

柴苓湯

柴苓湯

茯苓桂枝白

腎着湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

木甘草湯

腎着湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

半夏

越婢湯

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

湯

越婢湯

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

加味腎氣丸

湯

舟車丸

疏鑿飲子

疏鑿飲子

疏鑿飲子

疏鑿飲子

疏鑿飲子

疏鑿飲子

疏鑿飲子

成方切用

溼

卷七下

目錄

一

麥門冬湯

大分清飲

小分清飲

革薺分清

飲縮泉丸

琥珀散

茵陳蒿湯

茵陳三物湯  
茵陳將軍湯

升陽除

溼防風湯

禹功散

羌活勝溼湯

羌活除溼湯  
升陽除溼

湯東垣升  
陽除溼湯

大橘皮湯

八正散

防已飲

當

歸拈痛湯

蒼朮丸

平胃散

見消導門



疼痛。腰痛不能轉側。四肢痿弱痠痛。在肌肉則爲痲木。附腫黃疸。按肉如泥不起。在臟腑則爲嘔惡。脹滿。小水祕澀。黃赤。大便泄瀉。腹痛後重。脫肛癰疽等證。凡肌表經絡之病。溼由外而入者也。飲食氣血之病。溼由內而生者也。此其在外者爲輕。在內者爲重。是固然矣。然及其甚也。則未有表溼而不連臟者。裏溼而不連經者。此其溼病之變。不爲不多。故凡治此者。必當辨表裏。察虛實。而求其本也。然溼證雖多。而辨治之法。其要惟三。則一日溼熱。一日寒溼。一日風溼。蓋溼從土化。而取。四季。故時當溫熱。則火土合。氣而病爲溼。時當溫熱。則火土合。德而病爲寒溼。此溼病之隨時令而爲寒熱也。其有與風相搏。而病爲風溼者。其變尤爲無常。凡治溼熱者。宜利宜清。治寒溼者。宜燥宜溫。治風溼相搏者。或微發其汗。或顧其陽。慮其法尤宜通變矣。

五苓散

仲景

治太陽病發汗後大汗出胃中乾煩

躁不得眠欲飲水者少少與之令胃氣和則愈

若脈浮小便不利微熱消渴者此湯主之及中

風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水

水入即吐名曰水逆

表以外證未罷言裏以煩渴屬腑言邪熱挾積飲上

逆故外水格而不入及傷寒痞滿服瀉心湯不解渴而煩

躁小便不利

功損湯熱導飲故亦為消痞良方程郊倩曰邪在上焦而治在下焦

者使濁陰出下竅而清陽之在上竅者自能宣

化矣心邪不從心瀉而從小便瀉又一法也注通治諸溼腹滿水飲

成方切用

溼

卷七

五苓散

二

水腫嘔逆泄瀉水寒射肺或喘或咳中暑煩渴

身熱頭痛膀胱積熱便秘而渴霍亂吐瀉痰飲

溼瘧身痛身重此皆傷溼之見證也溼勝則脾

腫脹併於大腸則泄瀉水停心下則嘔逆水寒射肺則喘咳暑先入心故煩渴五苓利小水降

心火故兼治中暑煩渴肺病則金不能生水勝

膀胱熱則陽不能化陰故便秘而渴陰陽不利則

霍亂吐瀉溼勝則身痛身重大抵下不通利則陰陽不能升降而變證多矣

豬苓 茯苓 木 澤瀉 桂 為末每服三錢服

後多飲熱水汗出而愈傷暑者加硃砂燈心煎

病當用桂傷寒證中表未解者仍當用枝兼取解表

八炒共十 澤瀉一兩六 桂半兩 按雜

太陽之熱傳入膀胱之腑故口渴而便不通經

曰淡味滲泄爲陽二苓甘淡入肺而通膀胱爲

君水無當於五味故淡能利水茯苓走氣分豬苓走血分然必上行入肺清其化源而後能

下降利鹹味涌泄爲陰澤瀉甘鹹入腎膀胱同

利水道爲臣益土所以制水故以朮之苦溫健

脾去溼爲佐膀胱者津液藏焉氣化則能出矣

故以肉桂辛熱爲使熱因熱用引入膀胱以化

其氣使溼熱之邪皆由小水而出也有大熱如狂小便不利

利而用此湯者欲使太陽陽隨經之邪直達膀胱由溺而出也大熱利小便亦釜底抽薪之義陳

裏表之裏  
也太陽本  
膀胱腑也

方之七月

卷二

三

來章曰治祕之道有三。一曰肺燥不能化氣故用二苓澤瀉之甘淡以泄肺而降氣。一曰脾溼不能升精故用蒼朮之苦溫以燥脾而升精。一曰膀胱而化陰使水道通利則上可以止渴中可以去溼下可以泄邪熱也東垣曰五苓散太陽裏之下藥也太陽高則汗而發之汗則引而竭之渴者邪入太陽本也當下之使從膀胱出也小便利者不宜用蓋太陽病熱而渴小便若利則胃中津液已耗不宜再用五苓以劫奪其津液也五苓散分陰陽膀胱經之半表半裏也理中湯治吐瀉理中氣而分陰陽也活人云脈浮大是表證當汗其人發熱煩渴小便赤卻當下此是表裏俱見五苓散主之。五苓利本何以能止渴生津蓋溼熱壅於中焦則氣不得施化故津竭而小便不通也。用五苓利其小便水則溼熱下消津回而渴止矣亦內經通因通用之意東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以



導其溼傷食者有形之物也。轉則消化。或損穀。重則方可吐下。若汗下之後。內以津液。而便不利者。不可用五苓散。恐重以津液。而益虧其陰也。勿治之。便利自愈。一切陽虛不化。氣陰虛而泉竭。以致小便不利者。若再用五苓散。以劫其陰陽。禍如反掌。不可不慎。

**去桂名四苓散**

李東垣曰。無惡寒證。不可用桂。周揚俊曰。五苓為渴而小便不利者設。若不渴。則茯苓甘草湯足矣。若但渴。則四苓足矣。

**加辰砂名辰砂五苓散** 竝治小便不利。用二朮名二朮五苓散治

寒溼加茵陳名茵陳五苓散治溼熱發黃便秘

煩渴加羌活名元戎五苓散治中焦積熱去桂

澤瀉名豬苓散

治嘔吐病在膈上思飲水者

但用肉桂茯苓等分蜜丸名桂苓丸治冒暑煩

渴引飲過多腹脹便赤但用澤瀉五兩白朮二兩名

澤瀉湯金匱治心下支飲常苦眩冒但用茯苓白

朮等分名茯苓白朮湯治脾虛不能制水溼盛

泄瀉再加郁李仁入薑汁服名白茯苓湯治水

腫加川楝子治水疝加人參名春澤湯再加甘

草合四君子亦名春澤湯治無病而渴與病瘥後渴

者去桂加蒼朮甘草芍藥梔子黃芩羌活名二

朮四苓湯通治表裏溼邪兼清暑熱倍桂加黃

耆如朮之數治傷暑大汗不止加甘草滑石梔

子入食鹽燈草煎名節菴導赤散治熱蓄膀胱

便秘而渴如中溼發黃加茵陳水結胸加木通

合益元散治諸溼淋瀝再加琥珀名茯苓琥珀

湯謙甫治小便數而欠頻來而短少也合平胃散名胃苓

湯一名對金飲子治中暑傷溼停飲夾食腹痛

泄瀉及口渴便秘此上下分消其溼也按機要論泄瀉有屬風屬溼屬寒屬

火此因於外感者也三因言七情感動陽氣不

平亦致磨瀉此因於內傷者也外則當調六氣

內則當調五臟又有因飲食所傷而泄者法當

不固而泄者當除痰有脾胃氣虛而泄者當補中益氣使胃氣升騰而泄自止合黃連

香薷飲名薷苓湯治傷暑泄瀉合小柴胡湯名

柴苓湯治泄瀉發熱口渴瘧疾熱多寒少口渴

心煩以上三方並加薑棗煎

豬苓湯

仲景

治陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便

不通

成氏曰脈浮發熱熱在表也渴欲飲水熱在裏也小便不利熱結下焦津液不通也

準繩曰此浮字誤也是脈字下脫一不字也活人云脈浮者五苓散脈沉者豬苓湯按太陽篇

五苓散陽明篇豬苓湯桂枝湯按太陽篇

當用豬苓矣少陰篇下利六七日咳而嘔渴心

之脈必沉也。以此推之。少陰病下利六七日。欬

而嘔。渴心煩不得眠。下利不渴者裏寒也。渴者

熱也。欬而渴嘔有停飲也。渴而不利知小便必不利是熱邪已入膀胱也。立利小便則熱降而

便通治溼熱黃疸口渴渴赤。五苓滷。桂木。豬苓。滑石。故用

故用滑石

豬苓 茯苓 澤瀉 滑石 阿膠一雨

熱上壅則下不通下不通熱益上壅又溼鬱為

熱熱蒸更為溼故心煩而嘔渴便秘而發黃也

淡能滲溼寒能勝熱茯苓甘淡滲脾肺之溼豬

苓甘淡澤瀉鹹寒瀉腎與膀胱之溼滑石甘淡而寒體重降火通行上下之溼阿膠甘平潤滑以療煩渴不眠要使水道通利則熱邪皆從小便下降而三焦俱清矣吳鶴臯曰以諸藥過燥故又加阿膠以存津液王好古曰滑石爲至燥之劑徐之才曰燥可去溼桑白皮赤小豆之類是也蓋皆以行水之藥爲燥也

茯苓甘草湯

景仲

治傷寒水氣乘心厥而心下悸

者先治其水卻治其厥不爾水漬入胃必作利

也

太陽證飲水過多水停心下必悸火畏水故心陽惕然動不自安也亦治傷寒

汗出不渴者。經曰傷寒汗出而渴者五苓散主之。不渴者茯苓甘草湯主之。汗而解表利水而兼和中。亦治膀胱欬欬而遺

扶苓 桂枝兩二甘草兩一生薑兩三

淡能滲水甘能寧心助陽故用茯苓辛能散飲溫能發汗解肌故用薑桂益土可以制水甘平能補氣和中故用甘草

去生薑加白朮名茯苓桂枝白朮甘草湯。仲景治傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈

沉緊發汗則動經身為振搖者

逆滿氣衝寒邪伏飲上搏於膈

也故令頭眩沉為在裏且既經吐下復發其汗則湯益虛而津液耗故振搖也與此湯導飲和中益陽固衛金匱用治心下有痰飲胸脇支滿目眩

腎着湯

金匱一名乾薑苓朮湯

治傷溼身重腹痛腰冷不

渴小便自利飲食如故病屬下焦

腎主水溼性下流必舍於

其所合而歸於坎勢也腰為腎之腑冷溼之邪着而不移故腰冷身重是着痺也此由身勞汗出衣裏冷溼宣明用治胞痺膀胱熱痛溺於小

便上為清涕

風寒溼邪客於胞中氣不能化故水道不通足太陽經上額絡膀胱

陽經氣不得下行上入

腦而流於鼻則為清涕



乾薑

炮

茯苓

兩四

甘草

炙

白朮

兩炒二

有寒者加

附子經心錄加肉桂澤瀉杜仲牛膝治同

喻嘉言曰腰冷如坐水中非腎之精氣冷也故

飲食如故便利不渴且與腸胃之腑無預况腎

臟乎故但用甘溫從陽淡滲行水之藥足矣

小半夏加茯苓湯

金匱三因名大半夏湯

治卒嘔吐心下

痞膈間有水眩悸

水氣上逆則嘔停膈間則痞上干於頭則眩凌於心則悸

半夏

升一

生薑

兩半

茯苓

兩三

半夏生薑行水氣而散逆氣能止嘔吐茯苓寧

心氣而泄腎邪能利小便火因水而下行則悸眩止而痞消矣

除茯苓名小半夏湯金匱治支飲嘔吐不渴亦治

黃疸金匱云嘔家本渴渴者為欲解今反不渴

津液去必渴不可因渴而遽以為熱除茯苓生薑加人參白蜜名

大半夏湯金匱治反胃食入即吐東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐

但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者唯宜益胃推揚穀氣而已勿作

表實用辛藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈此仲景心法也

越婢湯金匱治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續

自汗出無大熱者

經曰肝腎并沉為石水并浮為風水水在皮膚故脈浮裏

無熱故不渴病本於風故汗出惡風無大熱者熱未盡退也

麻黃

兩

石膏

兩

生薑

兩

甘草

兩

大棗

十二枚

惡

風者加附子

風水在肌膚之間用麻黃之辛熱以瀉肺石膏

之甘寒以清胃

肺主通調水道胃主分別水穀

甘草佐之使風

水從毛孔中出又以薑棗為使調和營衛不使

其太發散耗津液也

胃為十二經之主脾治水穀為卑臟若婢經曰脾主

為胃行其津液是方名越婢者以發越脾氣通行津液外臺一名越脾湯即此義也

防已黃耆湯金匱

治風水脈浮身重汗出惡風及

諸風諸溼麻木身痛

東垣曰麻木為風人皆知之細核則有區別如久坐

亦麻木繩縛之人亦麻木非有風邪乃氣不行也當補肺氣麻木自去矣亦有因氣虛而風邪入而踞之所以風為虛象氣虛其本也

防已

黃耆

白朮

七錢

甘草

炙五錢

每服五

錢加薑棗煎腹痛加芍藥喘加麻黃有寒加細

辛氣上衝加桂枝熱腫加黃芩寒多掣痛加薑

桂溼盛加茯苓蒼朮氣滿堅痛加陳皮枳殼蘇

葉

防已大辛苦寒通行十二經開竅瀉溼爲治風  
腫水腫之主藥黃耆生用達表治風注膚痛溫  
分肉實腠理白朮健脾燥溼與黃耆竝能止汗  
爲臣防已性險而捷故用甘草甘平以緩之又  
能補土制水爲佐薑棗辛甘發散調和營衛爲  
使也

去白朮薑棗加茯苓

爲君

桂枝名防已茯苓湯

金匱

治水在皮膚四肢聶聶而動名皮水

防已行經絡茯苓善

滲泄黃耆達皮膚桂枝走肢節按五水脈浮惡風骨節疼痛名風水脈浮附腫按之沒指其腹

如鼓不惡風不渴名皮水當發其汗又云惡寒不渴名風水不惡寒而渴名皮水假令皮水不渴亦當發汗脈沉遲自喘名正水脈沉腹滿不喘水積腹中堅滿如石名石水脈沉遲發熱胸滿身腫汗如漿汁名黃汗

加味腎氣丸

金匱腎氣丸即桂附八味丸治婦人轉胞無車前牛膝

治脾

腎大虛肚腹脹大四肢浮腫喘急痰盛小便不利大便溏黃已成蠱證亦治消渴飲一溲一

腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚則為肺腫腎消者腎水衰竭望雷之火不安其位上炎於肺消渴引飲飲入於胃下無火化直入膀胱故飲一溲一也用桂附辛熱引其火歸元地黃純陰壯真水滋腎為治下消之劑

熟地黃四兩 扶苓三兩 山藥微炒 丹皮酒洗 山萸肉酒潤

澤瀉酒浸 牛膝酒浸 車前子微炒 肉桂兩 附子製熟五錢

### 蜜丸

土為萬物之母脾虛則土不能制水而洋溢水

為萬物之源天一腎虛則水不安其位而妄行

以致泛濫皮膚肢節之間因而攻之虛虛之禍

不待言矣經曰母盛盛母桂附八味丸滋真陰

而能行水補命火因以強脾桂附補命門火能

防水陽能化陰加車前利小水而不走氣加牛

膝益肝腎藉以下行使水道通而腫脹已又無

損於真元也

喻嘉言曰胃為水穀之海五臟六腑之原脾不能散胃之水精於肺

而病於中肺不能通胃之水。道於膀胱而病於上。腎不能司胃之關。時其輪泄而病於下。以致

積水浸淫無所底止。又曰按此方濟生以附子為君。此薛新甫重訂以茯苓為君。然腎之關門

不開。必以附子回陽蒸動腎氣。其關始開。胃中積水始下。以陽主開故也。關開即不用茯苓牛

膝車前而水亦下。關閉即車前茯苓用至無算抑莫之如何矣。用方者將君附子乎抑君茯苓

乎。張景岳曰水腫證乃脾肺腎三臟相干之病。蓋水為至陰。故其本在腎。水化於氣。故其標在

肺。水惟畏土。故其制在脾。今肺虛則氣不化精而化水。脾虛則土不制水而反尅腎。虛則水無

所主而妄行。求古治法。惟金匱內加減腎氣湯為對證之方。予屢用之。無不見效。此雖壯水之



劑而實卽脾肺腎三臟之正治也。蓋腎爲先天  
生氣之源。若先天元氣虧於下。則後天胃氣失  
其所本。而出脾及肺。治節所以不行。是以水積  
於下。則氣壅於上。而喘脹由生。但宜峻補命門。  
使氣復元。則三臟必皆安矣。今論其方。如所用  
桂附。以化陰中之陽也。熟地山藥山茱。以養陰  
中之水也。茯苓澤瀉車前。以利陰中之滯也。此  
能使氣化於精。卽所以治肺也。補火生土。卽所  
以治脾也。壯水通竅。卽所以治腎也。補而不滯。  
利而不伐。凡病水腫於中年之後。及氣體本弱  
者。但能隨證加減用之。其應如響。誠諸方之第  
一。更無出其右者。又曰。腫脹之治。凡脾腎虛證。  
如前論加減腎氣湯者。誠然善矣。然用之之法。  
猶當因此廓充。不妄執也。余嘗治一陶姓之友。  
年逾四旬。因患傷寒。爲醫誤治。危在呼吸。乃以  
大劑參附熟地之類。幸得挽回。愈後喜飲。未及  
兩月。忽病足股盡腫。脹及於腹。按之如鼓。堅而  
且鞭。因其前次之病。中氣本傷。近日之病。又因

酒溼。度非加減。腎氣湯不可。遂連進數服。雖無所碍。然終不見效。人皆料其必不可治。余熟計其前後病因。本屬脾腎大虛。而今兼以滲利。未免減去補力。亦與實漏卮者何異。元氣不能復病。必不能退。遂悉去利水等藥。而專用參附理陰煎。仍加白朮大劑與之。三劑而足腫漸消。二十餘劑。而腹脹盡退。自後凡遇全虛者。悉用此法。無一不效。

# 舟車丸

河間做仲景十棗例製此湯治一切水溼。

# 治水腫水脹形氣

## 俱實

腫脹者水道壅遏也。形氣俱實者口渴面赤氣粗腹堅大小便秘也。陽水先腫上

體肩背手膊手三陽經。陰水先腫下體腰腹脰胸足三陰經。腫屬脾。脹屬肝。腫則陽氣猶行。如單脹而不腫者。名鼓脹。為木橫剋土。難治。腫脹朝寬暮急為血虛。暮寬朝急為氣虛。朝暮俱急為氣血俱虛。腫脹由心腹而散四肢者吉。由四肢而入心腹者危。男自上而下。女自上而下者。

皆難治。腫脹唇黑則傷肝。缺盆平則傷心。肝出則傷脾。足心平則傷腎。背平則傷肺。皆不可治。腹脹身熱脈大者。是逆也。多死。

黑牽牛

炒四兩

大黃

二兩酒浸

甘遂

麩炒

大戟

麩炒

芫

花

醃炒

青皮

炒

橘紅

一兩

木香

五錢

輕粉

一錢

水丸

牽牛大黃大戟芫花甘遂皆行水之屬。劑能通行十二經之水。然腫屬於脾。脹屬於肝。水之不行由於脾之不運。脾之不運由於木盛而來傷之。是以不能防水而洋溢也。青皮木香疏肝泄肺而健脾。與陳皮均為導氣燥溼之品。使氣行

則水行脾運則腫消也輕粉無竅不入能去積  
痰故少加之然非實證不可輕投

減芫花大戟青皮陳皮木香加苳硝郁李仁名  
瀟川散薑湯下五分治同

疏鑿飲子 治遍身水腫喘呼口渴大小便秘證

為濕熱甚而氣實也此為陽水。陽水見陽證脈必沉數陰水見陰證脈必沉遲。

羌活 秦艽 檳榔 商陸 椒目 大腹皮

茯苓皮 木通 澤瀉 赤小豆 等分

薑皮煎

外而一身盡腫內而口渴便秘是上下表裏  
病也羌活秦艽解表疏風使溼以風勝邪由汗  
出而升之於上腹皮苓皮薑皮辛散淡滲所以  
行水於皮膚以皮行房商陸檳榔椒目赤豆去脹攻  
堅所以行水於腹裏木通瀉心肺之水達於小  
腸澤瀉瀉脾腎之水通於膀胱二藥瀉水也上下  
內外分消其勢亦猶神禹疏江鑿河之意也

實脾飲氏嚴

治肢體浮腫色悴聲短口中不渴二

便通利

脾胃虛寒土不能制水故水妄行而浮腫以無鬱熱故口不渴而便不秘此為

陰水。嚴氏曰。治陰水發腫。用此先實脾土。

白木土炒 茯苓 甘草炙 厚朴薑炒 大腹子 草豆

蔻 木香 木瓜 附子 黑薑 加薑棗

脾虛故以白木甘草補之。脾寒故以薑附草蔻溫之。脾溼故以大腹茯苓利之。脾滯故以木香厚朴導之。然土之不足。由於木之有餘。木瓜酸溫。能於土中瀉木。兼能行水。與木香同為平肝之品。使木不尅土。而肝和則土能制水。而脾實矣。  
水病當以健脾為主。使脾實而氣運。則水自行。宜參苓為君。視所挾證加減。苟徒用利水。

藥多致不救。醫貫曰：治腫滿先以脾土為主。宜補中益氣湯。六君子湯。或疑水脹喘滿而用補劑不益。脹滿平曰：肺氣既虛不可復行。其氣腎水既衰不可復利。其水服補劑初覺不快。過時藥力得行。漸有條理矣。喻嘉言曰：治水以實脾為先。不但陰水為然。然陰水者少。陰腎中之真陽衰微不能封閉而泛溢無制。爾方中不用桂而用厚朴大腹。尚有可議。

# 麥門冬湯

## 治水溢高原肢體皆腫

經曰：三焦者

道出焉。上焦不治。水溢高原。中焦不治。水停中脘。下焦不治。水畜膀胱。

### 麥門冬

五十枚  
薑炒

### 粳米

五十粒

吳鶴臯曰：肺非無為也。飲食入胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。

肺熱則失其下降之令以致水溢高原淫於皮膚而爲水腫醫罕明此實脾導水皆不能愈故用麥冬清肺開其下降之源粳米益胃培乎生金之母此治病必求其本也或問此證何以辨之曰肢體皆腫小腹不急初起便有喘滿此其候也

五皮飲

治

治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫

五加皮

地骨皮

茯苓皮

大腹皮

生薑

皮

一方五加易陳皮羅氏五加易桑白皮治



病後脾肺氣虛而致腫滿

五加祛風勝溼地骨退熱補虛生薑辛散助陽

水為陰邪

大腹下氣行水茯苓滲溼健脾於散瀉之

中猶寓補助之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

大分清飲

治積熱祕結小水不利或致腰腹下

部極痛或溼熱不利黃疸溺血邪熱畜血腹痛

淋閉等證

茯苓

澤瀉

木通

猪苓

枳殼

戊午刀月

溼

大分清飲

小分清飲

上

上

上

車前子

錢一

如內熱甚者加黃芩黃檗龍膽之

屬

如大便堅硬脹痛者加大黃二三錢

如

黃疸小水不利熱甚者加茵陳二錢

如邪熱

畜血腹痛者加紅花青皮各一錢五分

小分清飲

治小水不利溼滯脹腫不能受補等

證

茯苓

澤瀉

豬苓

錢二三

米仁

錢二

枳殼

厚朴

錢一

如陰虛水不能達加生地牛膝各二錢

如黃疸者加茵陳二錢

無內熱而寒滯不行

者加肉桂一錢

革薺分清飲

治陽虛白濁小便頻數漩白如油

名曰膏淋

腎氣虛不能管束而小便數膀胱有熱則水道清而清濁不分或敗精滲

入胞中及服熱藥飲食痰積滲入皆成淋濁

川革薺

石菖蒲

烏藥

益智仁

等分

甘草梢

減半

入鹽服一方加茯苓

革薺能解陽明厥陰溼熱去濁而分清

史國信曰若欲

興陽先滋筋力若欲便清先分肝火烏藥能疏革薺能泄陽明之溼入厥陰清肝火

邪逆諸氣逐寒而溫腎益智脾藥兼入心腎固

腎氣而散結烏藥益智等分山藥糊丸石菖蒲

開九竅而通心甘草梢達莖中而止痛使溼熱

去而心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疏泄

而為禁止者也

琥珀散 治氣淋血淋膏淋砂淋心腎氣鬱清濁相干熱畜膀胱

溺滿而痛日淋氣淋便清餘瀝血淋尿血而痛

膏淋便出如膏砂淋精結成石勞淋遇勞即發

冷淋寒戰後洩大抵多屬於熱熱甚生溼則水液渾濁而為淋若冷氣滯於膀胱而作淋者十

無一二也 二也 滑石 錢 琥珀 木通 篇蓄 木香 當歸

鬱金

炒一錢

爲末服

滑石滑可去着利竅行水篇蓄苦能下降利便

通淋琥珀能降肺氣通於膀胱木通能瀉心火

入於小腸

小腸爲心之腑主熱者也諸熱應於心者其水必自小腸滲入膀胱經所謂胞移熱於膀胱

則癰溺血是也

血淋由於血亂當歸能引血

歸經氣淋由於氣滯木香能升降諸氣諸淋由

心肝火盛鬱金能涼心散肝下氣而破血也

大法

鬱金琥珀開鬱青皮木香行氣蒲黃牛膝破血黃蘗生地滋陰東垣用藥凡例小腹痛用青皮

疏肝黃蘗滋腎蓋小

腹小便乃肝腎部位

茵陳蒿湯

仲景

治傷寒陽明病但頭汗出腹滿口

渴二便不利溼熱發黃脈沉實者

經曰陽明病發熱汗出此

為熱越則不發黃若但頭汗身無汗小便不利渴引水漿此為裏熱在裏必發黃黃者脾胃之色也熱甚者身如橘色汗如漿汁頭為諸陽之會熱蒸於頭故但頭汗而身無汗夫熱外越則不裏鬱下滲則不內存今便既不利身又無汗故鬱而為黃內有實熱故渴熱甚則津液內竭故小便不利凡瘧熱在裏熱入血室及水結胸皆有頭汗之證乃傷寒傳變故與雜病不同。溼在經則日晡發熱鼻塞在關節則身痛在臟腑則濡泄小便反濇腹或脹滿溼熱相搏則發黃熱勝色明而便燥溼勝色晦而便濇又黃病與溼病相似但溼病在表一身盡痛黃病在裏一身不痛。

茵陳

六兩

大黃

二兩

梔子

十四枚炒

茵陳發汗利水以泄太陰陽明之溼熱故為治

黃主藥梔子為臣大黃為佐分泄前後則腹得

利而解矣

茵陳梔子能導溼熱由小便出大黃能導溼熱由大便出

大黃易黃連名茵陳三物湯治同加厚朴枳實

黃芩甘草入生薑燈草煎名茵陳將軍湯

節菴治

同去梔子大黃加附子乾薑治寒溼陰黃

前證為陽

黃如身黃而色暗者為陰黃宜此湯黃疸小便黃赤不利為裏實宜利小便或下之無汗為表

實宜汗之或吐之若小便清是無熱也仲景云發黃小便便利當與虛勞門小建中湯自利腹

滿而喘不可除熱而除之必噦。小半夏湯主之。  
王海藏曰：內感傷寒，勞役形體，飲食失節，中州  
變寒，病生黃非外感而得。只宜理  
中大小建中等方，不可用茵陳。

# 禹功散

和子

## 治寒溼水疝陰囊腫脹

囊如水晶陰汗不絕謂水

疝蓋得之醉後而使內。二便不利得寒濕所凝不  
寒溼乘腎虛而流入也。

黑牽牛

四兩

茴香

炒一兩

爲末每一錢薑汁調下

或加木香一兩

牽牛辛烈能達右腎命門走精隧行水泄溼兼

通大腸風祕氣祕茴香辛熱溫散能煖丹田

小腸冷氣同入下焦以泄陰邪也



升陽除溼防風湯

東垣

治大便秘塞或裏急後重

數至圞而不能便或有白膿或血慎勿利之利之則必至重病反鬱結而不通矣以此湯升舉其陽則陰自降矣

通大便有升麻者即此意也

蒼朮

四錢

防風

二錢

茯苓

白朮

芍藥

錢一

如

胃寒泄瀉腸鳴加益智半夏各五分薑棗煎

蒼朮辛溫燥烈升清陽而開諸鬱故以為君白

朮甘溫茯苓甘淡佐之以健脾利溼防風辛溫

勝溼而升陽白芍酸寒斂陰而和脾也

劉宗厚曰飲食

入胃輸精心肺氣必上行然後下降若脾胃有傷不能上升反下流肝腎而成泄利者法當填補中氣升之舉之不可疏下此東垣發前人所未發也

羌活勝溼湯局治溼氣在表頭痛頭重或腰脊

重痛或一身盡痛微熱昏倦溼氣在表外傷於

陽則頭項腰脊痛着於太陰則肩背痛着於陰陽之經則一身盡痛惟着故痛且重也溼鬱則為熱然溼乃陰邪故微熱而昏倦也東垣曰頭痛脊強乃太陽之經氣不行也此湯主之

羌活 獨活錢一川芎 藁本 防風 甘草炙

分蔓荊子分三如身重腰中沉沉然中有寒溼

也加酒洗漢防已附子

經曰風能勝溼羌獨防葦芩蔓皆風藥也溼氣

在表六者辛溫升散又皆解表之藥使溼從汗

出則諸邪散矣藁本善治太陽風溼二活祛風勝溼兼通

關節川芎能升厥陰清氣上治頭痛甘草助若

諸藥辛甘發散為陽氣味甘平發中有補也水溼在裏則當用行水滲洩之劑喻嘉言曰經

熱表之則易下之則難故當變常法而為表散

吳鶴臯曰脾弱溼傷者二陳平胃之類主之溼

盛濡泄者五苓六一之類主之木腫發黃者五

皮茵陳之類主之今溼流關節非前藥所宜矣

無竅不入唯風為能故凡關節之病非風藥不

能到也三因用此湯加柴胡五分治臥而多驚

悸多魘洩者邪在少陽厥陰也如淋加澤瀉五

分經曰肝腎之病同一治此下焦風寒三經合

病非風藥行經不可也

除獨活蔓荊川芎甘草加升麻蒼朮名羌活除  
溼湯治風溼相搏一身盡痛除川芎加黃耆當  
歸蒼朮升麻名升陽除溼湯治水疝腫大陰汗  
不絕再加麥芽神麴豬苓澤瀉除當歸黃耆亦  
名升陽除溼湯東垣治脾虛瀉痢

大橘皮湯 治溼熱內攻心腹脹滿小便不利大

便滑瀉小便併於大腸故小及水腫等證

滑石六錢甘草 赤茯苓一錢豬苓 澤瀉 白朮

土桂五錢 陳皮半錢 木香 檳榔三分 加薑煎每服

五錢

赤茯苓澤瀉火行水白朮補脾肉桂化氣  
此五苓散也滑石清熱利溼甘草瀉火調中此  
六一散也溼熱內甚故加檳榔峻下之藥陳皮  
木香行氣之品使氣行則水行以通小便而實  
大便也

八正散

方局

治溼熱下注咽乾口渴小腹急滿小便

便不通

溼熱下注小腹急滿則小便當行矣而卒不行者熱秘之也

或淋痛

尿血或因熱爲腫

車前子

木通

瞿麥

篇蓄

滑石

甘草

梢

梔子

炒

大黃

加燈草煎一方

加木香

木通燈草清肺熱而降心火肺爲氣化之原心

爲小腸之合也車前清肝熱而通膀胱肝脈絡

於陰器膀胱津液之腑也瞿麥篇蓄降火通淋

此皆利溼而兼瀉熱者也滑石利竅散結梔子

大黃苦寒下行此皆瀉熱而兼利溼者也甘草

梢者取其徑達莖中甘能緩痛也雖治下焦而

不專於治下必三焦通利水乃下行也。日朱丹溪

不通有熱有溼有氣結於下宜清宜燥宜升有  
隔二隔三之治。如不因肺燥但膀胱有熱則瀉  
膀胱此正治也。如因肺燥不能生水則清金此  
謂隔二。如因脾溼不運而精不升故肺不能生  
水則當燥脾健胃此謂隔三。車前子茯苓清肺  
也。黃蘗黃芩瀉膀胱也。蒼朮白朮燥脾健胃也。  
又曰小便不通屬氣虛血虛實熱痰閉皆宜吐  
之以升其氣氣升則水自降氣虛用參朮升麻  
等先服後吐或就參朮中調理吐之血虛用  
四物湯先服後吐或就芩歸湯探吐之痰多二  
陳湯先服後吐或加香附木通實熱當利之或  
八正散蓋大便秘動則小便自通矣或問以吐法  
通小便其理安在曰譬如滴水之器上竅閉  
則下竅無自以通必上竅開而下竅始出也。

當歸拈痛湯

東垣

治溼熱相搏肢節煩痛肩背沉

戒方勿用溼

卷七下

當歸拈痛湯

圭

重或偏身疼痛或脚氣腫痛脚膝生瘡膿水不

絕及溼熱發黃脈沉實緊數動滑者溼則腫熱

瘡腫溼熱下注也發黃溼熱薰蒸脾胃也脚氣

多主水溼亦有夾風夾寒之異溼熱勝而為病

或成水泡瘡或成赤腫丹毒或如疝氣攻上引

下俱可用此湯損益為治凡手足前廉屬陽

明後廉屬太陽外廉屬少陽內廉屬厥陰內前

廉屬太陰內後廉屬少陰以臂貼身垂下大指

居前小指居後定之手足痛者當分是何經絡

用本經藥為引行其氣血則愈太陽羌活防風

陽明升麻白芷葛根少陽柴胡厥陰吳茱萸

川芎青皮太陰蒼朮白芍少陰獨活細辛

茵陳

酒炒

羌活

防風

升麻

葛根

蒼朮

白朮

甘草

炙

黃芩

酒炒

苦參

酒炒

當歸

豬苓



澤瀉 知母 一方加人參

羌活透關節防風散留溼爲君升葛味薄引而  
上行苦以發之白朮甘溫和平蒼朮辛溫雄壯  
健脾燥溼爲臣溼熱相合肢節煩痛苦參黃芩  
知母茵陳苦寒以泄之酒炒以爲因用血壅不  
流則爲痛當歸辛溫以散之人參甘草甘溫補  
養正氣使苦寒不傷脾胃治溼不利小便非其  
治也豬苓澤瀉甘淡鹹平導其留飲爲佐上下  
分消其溼使壅滯得宣通也

玉機微義曰此方  
東垣本爲治腳氣

溼熱之劑後人  
用治諸瘡甚驗。

防已飲 治腳氣足脛腫痛憎寒壯熱腳氣自外

嵐雨水或履溼熱之地自內傷得者生冷茶酒  
油麪溼熱之毒有溼有熱溼性下流故注於足  
溼熱分爭溼勝則憎寒熱勝則壯熱有兼頭痛  
諸證者狀類傷寒但脛腫掣痛為異爾此病忌  
用補劑及淋洗以溼熱得補增劇也亦不宜大  
瀉治之喜通而惡塞若腳氣衝心喘急不止嘔  
吐不休者死水凌火故也。先痛而後腫者氣  
傷血也先腫而後痛者血傷氣也筋脈弛張腫  
痛者名溼腳氣宜利溼疎風蹇縮枯細不  
腫而痛者名乾腳氣即熱也宜潤血清燥。

防已 木通 檳榔 生地酒洗 川芎 白朮炒

蒼朮鹽炒 黃蘗酒炒 甘草梢 犀角 熱加黃芩時

令熱加石膏肥人有痰加竹瀝薑汁或南星大  
便祕加桃仁紅花小便赤澀加牛膝或木瓜薏  
苡仁

防已行水療風濕下焦之溼熱檳榔攻堅利水  
墜諸藥使下行木通降心火由小腸出草梢泄  
脾火徑達腎莖黃蘗生地滋腎陰而涼血解熱  
蒼白二朮燥脾溼而運動中樞腫由血鬱川芎  
行血中之氣痛由肝實犀角涼心而清肝合之  
以清熱利溼消腫止痛也

蒼朮丸 治寒溼在脾泄瀉久不能愈者

真茅山蒼朮米泔浸一宿切炒如無破故紙浸

曬乾白芍炒黃四兩厚朴薑汁炒雲苓二兩甘草炙川椒

炒去閉口者炒出汗小茴香炒一兩為末糯米糊為丸桐

子大每服食遠清湯下七八十丸